

Checkliste Impfungen

Baby, ab 3 Monaten

- Diphtherie
- Haemophilus influenzae Typ b
- Hepatitis B (Gelbsucht)
- Pertussis (Keuchhusten)
- Tetanus (Wundstarrkrampf)
- Poliomyelitis (Kinderlähmung)

Vom 12. bis 15. Lebensmonat

- Masern
- Mumps
- Röteln

Eine zweite Impfung gegen Maser, Mumps und Röteln sollte vom 16. bis 24. Lebensmonat durchgeführt werden.

Ab Beginn des 5. Lebensjahres

Auffrischimpfung gegen

- Tetanus (Wundstarrkrampf),
- Diphtherie,
- Pertussis (Keuchhusten).

Im Alter von 9 bis 17 Jahren

Auffrischimpfung gegen

- Diphtherie,
- Pertussis (Keuchhusten), Tetanus (Wundstarrkrampf)
- Poliomyelitis (Kinderlähmung);

Im Alter von 18 bis 60 Jahren

Jeweils zehn Jahre nach der letzten Impfung Auffrischimpfungen gegen

- Tetanus (Wundstarrkrampf)
- Diphtherie.

Ab einem Alter von 60 Jahren

- Jährlich gegen Influenza (Grippe);
- alle sechs Jahre gegen Pneumokokken.